
Proveca - Läkemedel för barn

Sialanar®

GUIDE TILL ORAL ADMINISTRERING FÖR VÅRDARE

Du har fått den här broschyren av ditt barns
äkare eftersom barnet har ordinerats Sialanar.



1



Tvätta alltid händerna innan du ger läkemedel.

2



Kontrollera dosen och läs bipacksedeln som medföljer förpackningen.

3



Skruva loss det barnskyddande locket.




FÖRSTA GÅNGEN För in sprutadaptern med hål i flaskans hals. Den kan sedan sitta kvar för framtida användning.

Använd ALLTID den orala doseringssprutan som tillhandahålls i förpackningen för att ge rätt dos.




Använd inte en kopp eller en sked.



4

För in sprutan i sprutadaptern.



5

Vänd flaskan upp och ner och dra kolven nedåt till den ordinerade dosen.



6

Vänd flaskan uppåt och ta bort sprutan från flaskan.



7

Placera sprutan i patientens mungipa och tryck långsamt ner kolven så att läkemedlet kommer in i munnen.



PLACERA INTE SPRUTAN PÅ TUNGSPETSEN, EFTERSOM LÄKEMEDLET DÅ KAN RINNA UT UR MUNNEN.



8

Stäng patientens mun för att försäkra dig om att hen har svält medicinen.



Rengör ALLTID spruta och kolven efter användning och låt den torka. Får inte diskas i diskmaskinen. Sätt tillbaka locket på flaskan.

Sialanar (glykopyrronium) finns i 2 storlekar och ingår i läkemedelsförmånen

Läkemedelsform	Förpackningsstorlek	mg per ml	Pris (AIP)
glykopyrronium, oral lösning (320 microgram/ml)	1 x 250 ml (flaska)	0,4 mg	3.188
glykopyrronium, oral lösning (320 microgram/ml)	1 x 60 ml (flaska)	0,4 mg	923

Exempel på förbrukning av Sialanar

Dosnivå 1 (43-47 kg) 1.8ml Sialanar, 3 ggr dagligen = 5.4ml / dag En flaska 250ml räcker i 46 dagar	Dosnivå 2 (28-32 kg) 2.5ml Sialanar, 3 ggr dagligen = 7.5ml / dag En flaska 250ml räcker i 33 dagar
En utebliven dos skall INTE kompenseras med en extra dos – följ vårdgivarens rekommendation och doseringstabell som anger att varje dosnivå skall utvärderas i en vecka innan dosjustering till ny nivå skall göras (eller tills rätt dosnivå uppnåtts)	

Lathund för vårdgivare:

Dosnivå	MI x 3/dygn	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
1				
2				
3				
4				
5				

Mer läsning om salivläckage: Kunskapsöversikt Nationellt kunskapscentrum: www.mun-h-center.se/hjalpmedel/bocker-och-skrifter/dregling

Mininformation

Sialanar 320 mikrogram/ml oral lösning (glykopyrronium)

Läkemedel för funktionella gastrointestinala besvär. ATC-kod: A03AB02. Rx, F

Indikationer: Symtomatisk behandling av allvarlig kronisk dregling hos barn och ungdomar från 3 års ålder med kroniska neurologiska sjukdomar.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Graviditet och amning. Glaukom. Urinretention. Gravyt nedsatt njurfunktion, inklusive njursjukdom i slutstadiet som kräver dialys. Anamnes på intestinal obstruktion, ulcerös kolit, paralytisk ileus, pylorusstenos och myasthenia gravis. Samtidig behandling med fast oral formulering av kaliumklorid eller antikolinergika.

För fullständig förskrivarinformation, inklusive varningar och biverkningar se fass.se.

Baserad på SmPC godkänd 09/2022.

Vid frågor eller rapportering av biverkningar eller reklamationer- kontakta regulatory@frostpharma.com.